Coléoptères nouveaux de la République Argentine

par M. Pic.

Ptilodactyla griseosuturalis n. sp. — ♂ Oblongo-elongata, postice attenuata, nitida, griseo-argenteo pubescens, in sutura densiore, niger (forma typica), aliquot elytris pro majore parte rufescentibus et thorace brunnescente (var. nov. **rufescens**) ; antennis nigris, aliquot articulis primis rufescentibus, pedibus nigro-piceis aut rufis.

Oblong-allongé atténué postérieurement, brillant, orné d'une pubescence argentée plus dense sur la suture. Antennes peu épaisses longuement flabellées, 2ème article court, 3ème peu allongé; tête à ponctuation ruguleuse dense, yeux saillants; thorax peu court, non transversal, atténué en avant et subarqué, densément ponctué-granulé; écusson cordiforme, ponctué; élytres à peine plus larges que le thorax, peu allongés, atténués postérieurement, un peu striés, densément ponctués; pattes assez robustes. — Long. 4 - mill.

Province de Buenos Aires. Forme typique, in coll. Bruch et Pic; variété, in coll. Bruch.

Par les élytres ayant leur suture densément pubescente se rapproche de *P. puberula* Pic, mais tout autre par sa forme moins allongées, les élytres non subparallèles et longuement atténués en arrière.

Eucinetus argentinus n. sp. — Oblongo-subelongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, parum dense griseo aut luteo pubescens, rufus, scutello elytrisque pro parte vage brunnescentibus, infra corpore nigro-piceo, segmento ultimo abdominis testaceo-notata, pygidio testaceo.

De forme oblongue suballongée, retrécie aux deux extêmités, brillant et à pubescence grise ou jaune peu dense. Tête à ponctuation fine et éparse, yeux noirs petits, très distants; antennes grêles avec les 4 derniers articles testacés, en partie subglobuleux; thorax court très retréci en avant, à ponctuation fine et écartée; écusson grand; élytres peu dilatés derrière les épaules, allongés atténués postérieurement, un peu et diversement striés, strie présurturale très marquée, effacée en avant, intervalles strigueux; pattes peu allongées. — Long. 3 mill. (Córdoba) Alta Gracia. (Coll. Bruch).

Diffère de *E. strigipennis* Champ. par la forme, la coloration des pattes, etc.

Microscapha Bruchi n. sp. — Oblongo-elongata, antice et postice attenuata, holocericeo pubescens, nigra, capite pedibusque rufis, antennis testaceis.

Oblong-allongé, atténué aux deux extrêmités, orné d'une pubescence soyeuse. Tête rousse, petite, yeux noirs; antennes testacées, courtes, élargies à l'extrêmité; thorax court, retréci en avant, à ponctuation fine; écusson petit; élytres peu élargis après les épaules, atténués postérieurement, convexes, à ponctuation assez fine et irrégulière; pattes peu allongées. — Long. 2 mill.

Province de Buenos Aires: Río Santiago (coll. Bruch et Pic).

Diffère de *M. pulicaria* Champ. (ex description), par la coloration générale moins foncée, notamment par la tête rousse.

Orchesia (Orchestera) brasiliensis var. nov. **pallidior** — Elongata, angustata, subparallela, postice paulo attenuata, rufa aut rufo testacea, membris testaceis. — Province de Buenos Aires (Coll. Bruch et Pic).

Distinct de *O. brasiliensis* Champ. par la coloration plus claire et la forme plus étroite.

Bruchus catamarcanus n. sp. — Oblongus, subelongatus, parum nitidus, albo aut fulvo pubescens et albo notatus, niger, antennis ad basim pedibusque rufis, femoribus brunneo aut nigro notatis.

Oblong, suballongé, peu brillant, à dessins blancs, noir, membres en partie roux. Tête allongée, à ponctuation ruguleuse dense. Antennes peu allongées, assez épaisses, à premiers articles plus ou moins longs; thorax à ponctuation ruguleuse dense, non transversal, atténué en avant, sinué latéralement en majeure partie revêtu, de même que la tête, d'une pubescence fauve; écusson blanc; élytres peu distinctement plus larges que le thorax, peu allongés, subarqués latéralement, striés, en majeure partie revêtus d'une pubescence fauve, ornés, sur le milieu de la base, et sur chacun, de 2 courtes lignes grises peu distinctes et sur le milieu du disque, de plusieurs petits traits blancs rapprochés, formant une courte bande transversale, pygidium noir, orné sur son milieu, d'une ligne blanche élargie postérieurement en macule allongés. — Long. 4 mill.

Province de Catamarca: Andalgalá. (Coll. Bruch).

Voisin de *B. Bondari* Pic, plus grand, moins brillant, plus pubescent avec les élytres à fascie réduite nette, faite de macules allongées blanches juxtaposées.